

Activité 1 Aux origines des éléments chimiques

Introduction

En 1814, l'opticien allemand Joseph von Fraunhofer décompose la lumière solaire et y observe des centaines de **raies sombres**. Un demi-siècle plus tard, ces raies livrent une information que l'on croyait inaccessible : la composition chimique d'un astre situé à 150 millions de kilomètres.

Problématique : De quoi le Soleil est-il fait, et d'où viennent les éléments chimiques qui nous constituent ?

Savoirs et savoir-faire

Savoirs	Savoir-faire / capacités
- Les noyaux des éléments chimiques stables se forment dans les étoiles à partir de l'hydrogène initial, par des réactions nucléaires. - La matière connue de l'Univers est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium. - Dans les étoiles, ces réactions sont des fusions successives qui s'arrêtent au fer; les noyaux plus lourds que le fer se forment lors d'événements violents tels que les explosions de supernovae.	- Extraire et relier des informations d'un spectre et d'un texte historique. - Une équation de réaction nucléaire étant fournie, reconnaître s'il s'agit d'une fusion ou d'une fission. - Vérifier la conservation du nombre de masse A et du numéro atomique Z.

Document 1 Le spectre du Soleil et ses raies sombres

Chaque raie sombre correspond à l'absorption d'une longueur d'onde précise par l'atmosphère du Soleil. Les principales raies de Fraunhofer ont été attribuées à un élément chimique :

Élément	Longueurs d'onde des raies (nm)
Hydrogène (H)	656,3 ; 486,1
Hélium (He)	587,6
Sodium (Na)	589,0 ; 589,6
Magnésium (Mg)	518,4
Fer (Fe)	527,0
Calcium ionisé (Ca ⁺)	393,4 ; 396,8

Valeurs des raies de Fraunhofer NIST Atomic Spectra Database.




FIGURE 1 : Spectre de la lumière du Soleil dans le domaine visible.

Source : N. A. Sharp, NAO/NSO/Kitt Peak FTS/AURA/NSF <https://www.nso.edu/data/> Licence : usage éducatif (source institutionnelle publique US).

Document 2 De Fraunhofer à l'hélium (1814–1895)

En 1814, Joseph von Fraunhofer décompose la lumière du Soleil et y repère près de **570 raies sombres**, qu'il note de A à K. En 1859-1860, Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen montrent que **chaque raie est la signature d'un élément chimique** : un spectre permet ainsi d'identifier les éléments présents dans la source de lumière.


Le 18 août 1868, lors d'une éclipse totale observée en Inde, Jules Janssen détecte dans le spectre du Soleil une raie jaune à **587,6 nm**, qui ne correspond à **aucun élément connu sur Terre**. Norman Lockyer et Edward Frankland concluent qu'il s'agit d'un **nouvel élément**, qu'ils nomment **hélium** (du grec *hélîos*, le Soleil). Ce n'est qu'en **1895**, soit 27 ans plus tard, que William Ramsay isole l'hélium sur Terre : un élément découvert dans le Soleil avant de l'être sur notre planète.

Document 3 De l'hydrogène au fer : la fabrique stellaire

Quelques minutes après le Big Bang, la matière ne contient que de l'hydrogène et de l'hélium. Les autres éléments comme le carbone, l'oxygène ou le fer sont fabriqués plus tard, dans les étoiles, par des **réactions nucléaires**. Dans une étoile massive, chaque

Activité 1 Aux origines des éléments chimiques

combustible fusionne à son tour : quand l'un est épuisé, l'étoile se contracte, sa température augmente, et la fusion du combustible suivant démarre. Les noyaux de **fer** étant les plus stables, la chaîne **s'arrête au fer** : fusionner du fer ne libère plus d'énergie.



Dans une étoile massive :





FIGURE 2 : Bande 1 : chronologie cosmique. Bande 2 : la chaîne des fusions successives dans une étoile massive.


Ordres de grandeur pour une étoile d'environ 20 fois la masse du Soleil.

Document 4 Trois équations nucléaires


Voici trois équations de réactions nucléaires, notées A_ZX (A : nombre de masse, Z : numéro atomique). Leur type (fusion ou fission) n'est pas indiqué : vous devrez le déterminer dans les questions.



au cœur du Soleil (bilan global) étape 1 de la frise du Document 3



dans une étoile évoluée étape 2 de la frise du Document 3



dans un réacteur nucléaire

Remarque

Dans la première équation, les neutrinos émis ne sont pas représentés ; ${}^0_1\text{e}$ désigne un **positon**.

Document 5 SN 1987A : une supernova visible à l'œil nu




FIGURE 3 : SN 1987A, supernova observée en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan.

Source : ESO <https://www.eso.org/public/images/eso8704/> Licence : CC BY 4.0.

Communiqué ESO eso8704, 25 février 1987 (traduction du professeur) :

« Dans la nuit du 23 au 24 février 1987, une supernova est découverte dans le Grand Nuage de Magellan^a, une galaxie satellite de notre Voie lactée. [...] The supernova reached magnitude 4,6 and was **visible to the naked eye**. It is the brightest to be observed since the 1604 supernova^b [...]. A massive star has exhausted its nuclear fuel, collapses and then explodes, ejecting its outer layers. »

Ce que l'on sait aujourd'hui de ces explosions : Lors de l'effondrement puis de l'explosion, l'énergie libérée est telle que des noyaux **plus lourds que le fer** peuvent se former. L'explosion disperse ensuite dans l'espace toutes les couches de l'étoile : cette matière enrichie servira plus tard à former de nouvelles étoiles et des planètes.

^aGalaxie satellite de la Voie lactée, située à environ 180 000 années-lumière.

^bObservée par Johannes Kepler.

Questions

1. (a) À l'aide du Document 1, décrivez ce que l'on observe dans le spectre de la lumière solaire. Relevez ensuite **deux** éléments chimiques présents dans l'atmosphère du Soleil et la longueur d'onde qui permet de les identifier.
(b) Ces éléments existent-ils aussi sur Terre? Que peut-on en déduire sur la matière qui constitue les astres?

2. En 1868, la raie observée à 587,6 nm ne correspondait à **aucun** élément connu sur Terre. Expliquez le raisonnement qui a conduit à annoncer l'existence d'un nouvel élément chimique, et précisez ce qui l'a confirmé en 1895.

3. D'après le Document 3 (bande 1), quels éléments chimiques existaient trois minutes après le Big Bang, et dans quelles proportions? Le carbone, qui nous constitue, était-il déjà présent?

4. Le Document 4 présente trois équations dont le type n'est **pas** indiqué.
(a) Pour l'équation ① (cœur du Soleil) : combien de noyaux entrent en réaction? Combien en sortent? Le noyau obtenu est-il **plus gros** ou **plus petit** que ceux de départ?
(b) Répondez aux mêmes questions pour l'équation ③ (réacteur nucléaire).
(c) L'une de ces transformations est une **fusion**, l'autre une **fission** : associez chaque terme à la bonne équation, puis **énoncez en une phrase** le critère qui permet de les distinguer.

Activité 1 Aux origines des éléments chimiques

5. En appliquant **le critère que vous venez d'énoncer**, indiquez la nature de l'équation ②. Vérifiez ensuite, pour **chacune** des trois équations, la conservation du nombre de masse A et du numéro atomique Z .

6. À l'aide des Documents 3, 4 et 5, expliquez en quelques phrases comment, à partir du seul hydrogène initial, la centaine d'éléments chimiques stables a pu être produite. Précisez **jusqu'à quel élément** les fusions successives peuvent aller dans une étoile, et ce qui se produit pour les éléments **plus lourds**.

♥ À retenir

Pour aller plus loin Observer le ciel, c'est observer le passé

7. Le Document 5 indique que le Grand Nuage de Magellan est situé à environ 180 000 années-lumière. En déduire il y a combien de temps l'explosion de SN 1987A s'est réellement produite. Que cela nous apprend-il sur ce que l'on observe en regardant le ciel?
Donnée : Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année.

8. En 1835, le philosophe Auguste Comte écrivait à propos des astres : « Nous ne pourrons jamais étudier par aucun moyen leur composition chimique. »^a À l'aide des Documents 1 et 2, expliquez pourquoi cette affirmation a été démentie moins de trente ans plus tard.

^aA. Comte, *Cours de philosophie positive*, 19^e leçon, 1835.